

DYRKNINGSNOTE

FOR

ARAUCARIA COLUMNARIS

ARAUCARIA HETEROPHYLLA

	<p>Araucaria columnaris (syn A. excelsa)</p> <p>Araucaria heterophylla</p>
Botanik	<p>Familie: Araucariaceae</p> <p>Hjemsted: Ny Caledonien, Norfolk Island.</p>
Formering	<p>Frøformerig: Det er lettest at formere via frø, men problemet er dels, at det kun er hvert 4-5 år, der rigtig produceres mange frø, (de høstes i naturen), dels, at planterne ofte er ret forskellige.</p> <p>Frøene skal sås helt friske, helst ikke mere end 10-14 dage efter høst, for at give en tilfredsstillende spiringsprocent.</p> <p>Voksemediet, som er en letgødet sphagnumblanding med pH på ca. 6, lægges ud i et 6-10 cm tykt lag på bed. Frøene lægges med undersiden mod voksemediet i rækker så tæt som muligt og så hurtigt som muligt, da spiringen allerede er i gang. Kan alle frøene ikke lægges ud første dag, lægges resten i en tyndt lag på plastik med undervarme, og de vandes lidt.</p> <p>Spiren løfter frøkapslen op fra voksemediet, og kapslen skydes senere af.</p> <p>Frøet vejer 0,75 - 1,0 g, og måler ca. 2,5 x 1,5 cm.</p> <p>Der sås 2.000 frø til 1.000 planter, og der sås 800 – 1.200 frø pr. m².</p> <p>Ved 28 - 30°C i voksemediet og 26 - 28°C i luften varer spiringen ca. 10 dage.</p> <p>Spiringen foregår i plasttelt, som åbnes/fjernes efter ca. 3 uger.</p> <p>Voksemediet holdes fugtigt, og efter 6-8 uger begynder man at vande med en svag gødningsopløsning.</p> <p>Stiklingeformerig.</p> <p>Araucaria kan også stiklingeformeres, der anvendes topstiklinger.</p>