

**STANDARD DYRKNINGSVEJLEDNING
FOR
ANTIRRHINUM MAJUS**



Foto: Floradania.dk

	Antirrhinum majus
Botanik	Familie: Scrophulariaceae Hjemsted: Sydvesteuropa til Nordvestafrika
Formering	Frøforming. Frøet er lysspirende, så der dækkes kun med plast for at undgå udtørring. Til 1.000 planter anvendes 1 g frø, hvis det drejer sig om F ₁ - hybrider anvendes kun 0,3 g. Ved 18-20°C sker spiringen i løbet af 10-14 dage. Efter spiringen holdes 16-18°C, luft ved 22°C.
Potning, Pladsforbrug	4-8 uger efter såning pottes i 9 cm potte i en letgødet sphagnumblanding, pH 5,5-6,5.
Klima	Temperatur: 16-18°C, luft ved 22°C. Ingen skygge . Relativ luftfugtighed helst ikke over 75%.
Vand, gødning	Planterne holdes fugtige, men der må ikke være stående vand. Der gødes med kalibetonet gødning, Lv 1,5-1,7.
Vækstregulering	Knibning giver lidt kortere stængler på brydningerne.
Skadegørere	Meldug, falsk meldug, løvemundsrust, Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, gråskimmel, bladlus, spindemider
Blomsterdannelse	Løvemund er en kvantitativ langdagsplante. Knopdannelsen finder sted efter et bestemt antal timers lys, og dette antal er næsten forskelligt fra sort til sort. Efterhånden som dagene bliver længere, danner planterne hurtigere blomster. Tidlige sorter behøver færre timers lys end de sene sorter for at danne blomst. Belysning med lav intensitet i hele produktionsperioden kan fremme blomstringen, men kvaliteten bliver ikke forbedret. I de tidligste udviklingsstadier er følsomheden over for daglængden størst, dvs. ind til 50-60 dage fra såtidspunktet, så hvis man vil have effekt af belysningen, må det være på dette stadium. Langdagseffekten kan også opnås ved 2 timers natafbrydelse.
Kulturtid	Ved at så først i februar er planterne salgsfærdige først i maj.
Litteratur	Evers, G., 1995: Antirrhinum für die Topfkultur. Gärtnerbörse (42):1855.