

D Y R K N I N G S N O T E

F O R

C U P H E A I G N E A

	Cuphea ignea – Cigaretblomst
Botanik	Familie: Lythraceae. Hjemsted: Mexico.
Formering	Frøformeres. 1 g = 600 frø. Der anvendes 2,5 g pr. 1.000 planter. Der sås fra midt i februar til slutningen af marts ved 22-25 °C. Midt i marts prikles, 18°C.
Potning	Midt i april pottes i en 9 cm potte.
Klima	Temperatur: 14-16°C. Dyrkes lyst.
Væksthusregulering	Cyphea ignea har en naturlig god forgrening, men stiklingeformerede og tidlige hold frøformerede planter bør knibes blødt over 4. - 5. bladpar. Der skal gives afstand til tiden – planterne løber let.
Blomstring	Blomstrer midt i maj.
Planteskadegørere	Pythium, phytophthora, spindemider
Litteratur	Essig,W., 1984: Weniger bekannte Topf- und Beetpflanzen unter die Lupe genommen. Zierpflanzenbau (23): p. 1020-1023. Wikesjö, k., 1981: Sex vakra ovanliga utplanteringsväxter: Arctoris, Cuphea, Felicia, Gazania, Lantana och Osteospermum (Dimorphotheca). Trädgård 204, Alnarp.