

DYRKNINGSNOTE

FOR

BIDENS FERULIFOLIA



Foto: Floradania.dk

	BIDENS FERULIFOLIA
Botanik	Familie: Compositae Hjemsted: Sydarizona til Guatemala.
Sorter	B.f. 'Gold Marie.' B.f. 'Samsara.' B.f. 'Golden Star' B.f. 'Peters Goldteppich' Nyere sorter er blandt serierne Bidens Campfire®, Bidens Beedance® og Biden Dorado.
Formering	Stiklingeformering. Rodning ved 20°C Efter rodning kan planterne knibes på stikkebedet.
Potning Pladsforbrug	Der pottes 3 småplanter i en 15-25 cm ampel, 1 plante i 10-12 cm potte. Slutafstand for 10-12 cm potter: 25-30 planter pr. m2
Klima	Temperatur: De første par uger efter oppotning holdes 18-20°C, derefter sænkes temperaturen gradvist over ca. 1 måned til 12-14°C. Ved 10-12°C bliver kulturtiden lidt længere, men planterne bliver mere kompakte. Skygge: Planterne er meget lyskrævende, så der skygges ikke.
Vand Gødning CO₂	Bidens er meget vand- og næringskrævende, gødningssammensætningen kendes ikke, mere kalium end kvælstof. Lv sandsynligvis 1,7 - 1,9.
Vækstregulering	Knibning: Kan knibes 1. gang på stikkebedet eller i forbindelse med oppotning. Tætte planter fås ved yderligere 1-2 knibninger, sidste gang 6-8 uger før salg. Bidens reagerer godt på 'Morgendrop' og negativ DIF, men det forlænger kulturtiden i forhold til samme dag- og nattemperatur. Retardering: Planterne har brug for vækstretardering.
Blomstring	Planten er en fakultativ langdagsplante, hvilket betyder, at hvis blomsterne skal dannes i kort dag, må temperaturen sænkes til 10-14°C.
Skadegørere	Gråskimmel, mellus, minerlarver Frankliniella.