

**DYRKNINGSNOTE**

**FOR**

**MANETTIA BICOLOR**

	<b>Manettia bicolor</b>
<b>Botanik</b>	<p><b>Familie:</b> Rubiaceae</p> <p><b>Hjemsted:</b> Brasilien, omkring Rio de Janeiro</p> <p><b>Vækstform:</b> Halvbusk med rankende skudvækst. Bladene er ovale til ovalt tilspidsede, modsat stillede. Med alderen bliver skuddene træagtige. Blomsterne, som er ind til 2 cm lange, og rørformede, dannes i bladhjørnerne. Blomsterne er røde og bliver mod rørenden gullige.</p>
<b>Formering</b>	<p><b>Stiklingeformeres.</b></p> <p>Der anvendes ledstiklinger med 1 bladpar, 3-4 cm lange. Ved 20-25°C i jorden og høj luftfugtighed dannes rødderne i løbet af 1-2 uger.</p> <p>Der stikkes i en letgødet sphagnumblanding, pH 5,0-5,5. Højere eller lavere pH bevirker en dårlig vækst, og kan forstærke bladrandnekroser.</p>
<b>Potning</b>	Pottes i 11-12 cm potte, 3 planter pr. potte.
<b>Klima</b>	<p><b>Temperatur:</b> 20-22°C, dag/nat.</p> <p>Lave temperaturer på 5°C tåles, når planterne er tørre, men det hæmmer væksten og blomsterdannelsen meget, og kulturtiden forlænges væsentligt.</p> <p>Relativt høj luftfugtighed på 75-80%. For tør luft kan medføre bladrandnekroser.</p>
<b>Gødning</b> <b>CO<sub>2</sub></b>	<p>Manettia ønsker en ensartet vand- og gødningstilførsel.</p> <p>Hvis planten dyrkes for vådt, bliver bladene klorotiske. Ved høje saltkoncentrationer (Lv) reagerer planterne hurtigt med rodkader og bladrandnekroser.</p>
<b>Blomsterdannelse</b> <b>Blomsterudvikling</b>	Manettia er en fakultativ kortdagsplante. En kortdagsbehandling på 8 timer dag i 8 uger fører ikke kun til en forøgelse af blomsterantallet, men også til en ca. 4 uger tidligere blomstring, sammenlignet med dyrkning under lang dag.
<b>Vækstlys</b>	I vinterperioden vil vækstlys, 30-40 W pr. m <sup>2</sup> SON-T give en kraftigere plantevækst.
<b>Vækstretardering</b>	Knibning bør foretages 1-2 gange, for at få en god sideskudsdannelse. Der skal sandsynligvis knibes nok en gang.
<b>I øvrigt</b>	Manettia bindes på stok eller bøjle.
<b>Holdbarhed</b>	Den enkelte blomst holder ca. 10 dage.

<b>Skadegørere</b>	Mellus Pythium (ved dårlige vækstbetingelser) Spindemider
<b>Kulturtid</b>	Afhængig af årstid og mørklægningsmuligheder er kulturtiden 14 - 20 uger fra stikketidspunktet. Formering i september er gunstig for at opnå naturlig kortdag.
<b>Litteratur</b>	Grüneberg, H. 1994: <i>Manettia bicolor</i> . Taspo, Gartenbaumagazin (8): p 47.