

**STANDARD DYRKNINGSVEJLEDNING**

**FOR**

**IPOMOEA TRICOLOR**



*Foto: floradania.dk*

	<b>IPOMOEA TRICOLOR</b>
<b>Botanik</b>	<b>Familie:</b> Convolvulaceae <b>Hjemsted:</b> Tropisk Amerika
<b>Anvendelsesområde</b>	Et-årig klatreplante
<b>Formering</b>	Frøformeres Der anvendes 80 g frø til 1000 planter. Der sås direkte i salgspotten, 3-5 korn pr. 11-13 cm potte. Såmediet er en letgødet spagnumblanding, pH 5.5-6.5. Ved 18°C varer spiringen ca. 14. dage.
<b>Pladsforbrug</b>	De første 6-7 uger efter såning står planterne pottetæt. Derefter sættes på afstand, ca. 25 planter pr. m <sup>2</sup> .
<b>Vand Gødning</b>	Ipomoea har et stort næringsbehov, gødnings sammensætning i forholdet: N : P : K : Ca : Mg + mikronæring 100: 8 : 160: 48 : 13 Lv = 2.0 - 2.2
<b>Klima</b>	Temperatur 12-15°C. Ingen skygge.
<b>Skadegørere</b>	Spindemider
<b>Produktionstid</b>	Fra såning til salg ca. 3 mdr.
<b>Salgsprodukt</b>	Bindes på bøjle eller snos om en 40 cm stok.