

DYRKNINGSNOTE

FOR

DELPHINIUM SP.



Foto: floradania.dk

Copyright HortiAdvice 2023

	Delphinium sp.
Botanik	Familie: Ranunculaceae Hjemsted: Sydeuropa
Formering	Frøforming , kan sås fra december til maj. Der anvendes 5-10 g frø pr. 1000 planter, afhængig af art og sort. Ved 20°C spirer frøene på 20-30 dage, ved 26°C varer spiringen 2-3 uger.
Potning	Prikling 4-6 uger efter såning eller der priklepottes 6-8 uger efter såning i 10 cm potte eller bokse 18-20°C.
Klima	Efter potning: Temperatur 5-10°C.
Gødskning	Delphinium har et højt gødningsbehov.
Blomstring	Delphinium er daglængdeneutral. På friland begynder blomstringen i slutningen af juni. I hus kan planterne blomstre i april-maj. Temperaturen holdes på 10-15°C, og der luftes ved 16-17°C for at undgå blød vækst.
Skadegørere	Pythium: Rødderne bliver glasagtige, ligner rodbland. Rhizoctonia: Indsnøring af rodhalsen, evt. "spindelvæv" på jordoverfladen. Phoma exigua (bladpletter): Svampen ses især i fugtigt klima og forårsager sorte pletter på blade, stængel og blomst. Misdannelser af stængel og blomster kan ses. Angrebene ses især i bunden af planterne. Phyllosticta ajacis (bladpletter): De sortbrune pletter er regelmæssigt runde eller ovale. De er lette at se på oversiden af bladene. De angrebne planter fjernes og brændes. Meldug (Erysiphe polygoni): Hvid svampebelægning på oversiden af bladene og i alvorlige tilfælde på skudspidserne. Forebyggende kan der dampes med svovl, hvis det er tilladt at anvende. Kronråd (Sclerotium delphinii): Planten visner og vælter pga. råd ved stængelbasis. På rødderne ses gul-brune sclerotier (hvilelegemer). Bladlus Minerfluer

	Sørgemyg: anvend nematoder.
Produktionstid	4 måneder.