

DYRKNINGSNOTE

FOR

CERATOSTIGMA PLUMBAGINOIDES

	<p>Ceratostigma plumbaginoides Kinesisk blyrod</p>
Botanik	<p>Familie: Plumbaginaceae Hjemsted: Vestlige Kina</p>
Formering	<p>Stiklingeformeres i reglen Temperaturen holdes på 20-24°C, efter ca. 2 uger har stiklingerne rod</p>
Potning Pladsforbrug	<p>3-4 uger efter stikning pottes 3 småplanter i en 11 cm potte. Efter potning holdes 18°C i 2 uger, til rødderne er i gang.</p>
Klima	<p>Efter de 2 uger ved 18°C kan temperaturen sænkes til 14°C, men det bevirker, at bladene bliver violette, og det passer ikke til de blå blomster.</p>
Blomsterinduktion	<p>Den hurtigste og mest ensartede blomstring får ved en daglængde på 14 timer. Planterne blomstrer ikke eller kun dårligt hvis daglængden bliver længere eller kortere end 14 timer. Ved en 14 timers dag blomstrer planterne efter 7 uger ved 20°C. Når først planterne er inducerede til blomstring ved 14 timers dag, vil de blive ved med at blomstre, også under andre daglængder, men ikke så meget og så forudsigeligt.</p> <p>Ved daglængder under 12 timer, kan planterne ikke induceres til blomstring.</p>
Moderplanter	<p>Moderplanter dyrkes ved 24 timers lys, så sker der ingen blomsterinduktion.</p>
Produktionstid	<p>Stikning i uge 4 giver salgsplanter i slutningen af maj. Stikning uge 8 giver salgsplanter midt i juni og stikning i uge 13 giver salgsplanter i slutningen af juni.</p>
Litteratur	<p>Niu,G. et.al., 2001: Ceratostigma plumbaginoides. Greenh. Grower 19(12)96,98,100.</p>