

STANDARD DYRKNINGSVEJLEDNING

FOR

HEBE X FRANCISCANA 'VARIEGATA'

HEBE ANDERSONII



Foto: floradania.dk

	Hebe x franciscana 'Variegata' Hebe x andersonii
Botanik	Familie: Scrophulariaceae Hjemsted: New Zealand (Tidligere navn: Veronica)
Formering	Stiklingeformerer. Topstiklinger på ca. 5 cm stikkes om efteråret i kasser eller i formeringsenheder, temperatur 18°C. Overvintret i hus.
Potning Pladsforbrug	Der pottes 2 småplanter i en 11 cm potte. Temperatur 17°C. De ældste planter pottes i januar, de yngste i marts-april.
Klimaforhold	Temperatur: Stikning ved 18°C. Når planterne har fået rødder, sænkes temperaturen, oftest holdes blot frostfrit. I begyndelsen af januar hæves temperaturen til 10-15°C. Efter oppotning holdes 17°C. Skygge: Kun skygge ved meget kraftig indstråling, for at undgå solsvidning.
Vand Gødning CO₂	Efter potning vandes med gødningsblanding Sammensat i forholdet: N : P : K : Mg : Ca 100 : 16 : 125 : 84 : 12 + mikronæring. Lv 1,5-1,7
Vækstregulering	Knibning: Kan knibes før potning, i forbindelse med denne eller 1-2 uger senere, dog ikke senere end februar. Er stiklingen stor nok, kan den stikkes. Retarding: For at opnå kompakte planter kan retarding anbefales. Der er dog pt. ingen godkendte vækstreguleringsmidler.
Blomstring	De fleste af de dyrkede arter og sorter induceres til blomstring ved en kølebehandling i 6 uger. Temperaturen behøver dog ikke at komme under 9-10°C. Efter kølingen kan temperaturen hæves til 14-17°C. Meget lave temperaturer i vinterperioden forsinker blomstringen. 'Variegata' blomstrer tidligst, og flest planter danner blomst, hvis overvintringstemperaturen er 14-17°C
Særlige forhold	Ca. 20. maj flyttes på friland, 25 planter pr m ² . Sælges herfra fra begyndelsen af juli.
Skadegørere	Bladlus

	<p>Meldug Falsk meldug Colletotrichum (Gloeosporium) Gråskimmel</p>
Litteratur	<p>Noack, L. 1991: Environmental control of flower induction in horticultural plants. Case study: Hebe. Ph.D. thesis. KVL.</p> <p>Noack, L. og E. Adriansen, 1988: Vækstregulering og blomstring i Hebe x franciscana 'Variegata'. Gartner Tidende <u>15</u> p. 394-95.</p> <p>Reimherr, P. 1989: Blüteförderung bei Hebe. Deutscher Gartenbau <u>2</u> p. 76-77.</p> <p>Steffen, K. 1992: Erfolgreiche Freilandnutzung mit Hebe. Zierpflanzenbau (19): 845-847.</p>