

DYRKNINGSNOTE

FOR

HETEROCENTRON - HYBRID 'CASCADE'

(CENTRADENIA-HYBRID)

	HETEROCENTRON-HYBRID 'CASCADE' (Centradenia-hybrid)
Botanik	Familie: Melastomataceae. Hjemsted: Bjergene i Syd- og Mellemerika.
Formering	Der anvendes 4-5 cm lange top- og ledstiklinger. Stikning direkte i salgspotte eller i formeringsenheder/pløksystemer. Rodning ved 20°C.
Potning Pladsforbrug	Der pottes i en letgødet sphagnumblanding, pH 5.5 - 6.0. 3 planter i 15-25 cm ampel. 1 plante i 11-13 cm potte, stikafstand ca. 30 planter pr. m ² .
Klimaforhold	Temperatur: 18-20°C de første uger efter gødning, og potning, derefter 16-18°C. Når alle sideskuddene er brudt godt, sænkes temperaturen til 12°C og holdes der til salg. Tåler ikke temperaturer under 8°C. Der skal ikke skygges.
Vand Gødning CO₂	Tåler ikke udtørring, men heller ikke stående vand. Gødningssammensætningen er ikke kendt. pH 5.5 - 6.0, Lv 1.2 - 1.5.
Blomstring	Blomsterne induceres ved 15°C og tiltagende lysmængde / daglængde. Udviklingen sker ved 20°C og 15°C nat.
Vækstregulering	Knibning: Knibes 1-2 gange, første gang over 2. bladpar kort efter oppotning. Retardering: Hvis planterne dyrkes ved 12°C er retardering i reglen ikke nødvendig, men den lave temperatur forsinket udviklingen, så det kan blive nødvendigt at hæve temperaturen til 15°C.
Skadegørere	Gråskimmel Mellus