

DYRKNINGSNOTE
FOR
AJANIA PACIFICA



Foto: Floradania.dk

	Ajania pacifica Syn: Chrysanthemum pacifica
Botanik:	Familie: Compositae Hjemsted: Japan
Formering	Stiklingeformeres. Stiklinger leveres primært fra marts til ultimo august. Der stikkes 1 stikling på 5 cm i en 8-10 cm potte, 3 stiklinger i en 12-14 cm potte. Ved 20-23°C roder stiklingerne på 15-18 dage. Ofte købes rodede småplanter.
Potning Pladsforbrug	Pottes i <u>meget</u> porøs sphagnumblanding, god afdræning. Uknebet, 9 cm: 60 pl. /m ² Uknebet, 10,5 cm potte: 45 pl. /m ² Knebet, 11 cm potte: 35 pl. /m ² Knebet, 12 cm potte: 30 pl. /m ² 13 cm potte: Højst 25 pl. /m ² Det er vigtigt, at planterne får den nødvendige afstand, og til tiden, ellers får man ikke den karakteristiske kugleform.
Klima	Dyrkes bedst i fuld sol og ved 20-22°C, men tåler ned til 18°C, og skal da holdes forholdsvis tørt.
Vækstregulering	Kan knibes 1 gang. Skal ikke retarderes kemisk.
Gødning	Ingen oplysninger, man kan sandsynligvis bruge krysantemumgødning. Planten har ikke noget stort gødningsforbrug, men det er vigtigt at blive ved med at gødske lige til salgstidspunktet, ellers bliver bladene i bunden gule. Det samme sker, hvis planterne bliver for tørre.
Blomstring	Kortdagsplante. Kort dag i 9 uger giver bedst blomstring, daglængden skal være 10 timer. Kortdagsbehandlingen begyndes 2-4 uger efter oppotning. Fra november til og med februar er dagen naturlig kort. I de første par uger skal der gives dagforlængelse eller vækstlys for at planten ikke skal blive for lille.
Produktionstid	Uknebetne planter blomstrer 7-10 uger efter begyndelse af kort dag, knebetne planter forsinkes 1-2 uger. Rodede småplanter er salgsfærdige på 9-10 uger.

Litteratur

Ann. 1996: Neuheitenschau. DeGa (29):1604.

Gildemeister, H., 1996: *Ajania pacifica*. The New Plantsman 3(2):120-121

Vissers, M., Thomas, F. 1999: *Ajania pacifica* 1+2+3
Verbondnieuws 43(19):43-45 + 43(21):4-6 +
44(1):46-47