

DYRKNINGSNOTE

FOR

JUSTICIA PAUCIFLORA



Foto: floradania.dk

	<p>Justicia pauciflora</p> <p>Syn: Jacobinia pauciflora</p>
Botanik	<p>Familie: Acanthacea</p> <p>Hjemsted: Brasilien</p>
Formering	<p>Normalt tages topstiklinger fra marts til juli, men der kan stikkes i august.</p> <p>Der stikkes i formeringsenheder.</p> <p>Ved 20-22°C sker roddannelsen på ca. 3 uger.</p> <p>Kan formeres med frø i febr.-marts, men det er ikke almindeligt.</p> <p>Let skygge efter rodning kan være nødvendig.</p>
Potning Pladsforbrug	<p>Der pottes i 10-11 cm potter. pH 5-6. 1-2 småplanter pr. 10-11 cm potte.</p> <p>Temperatur 18-20°C.</p> <p>Ingen skygge.</p>
Klima	<p>Temperatur:</p> <p>Roddannelse sker bedst ved 20 - 22°C, senere sænkes temperaturen til 16°C, senere kan planterne sættes på friland.</p> <p>Når planterne i september kommer ind er 10 - 12°C tilstrækkeligt, planterne tåler ned til 6°C, men man må da være opmærksom på at luftfugtigheden ikke bliver for høj, så planterne bliver angrebne af gråskimmel.</p>
Vand Gødning CO₂	<p>Planterne må aldrig tørre ud, da udtørring bevirker blad- og knopfald.</p> <p>pH mellem 5 og 6. Gødnings sammensætningen kendes ikke.</p>
Vækstregulering	<p>Knibes 1-2 gange.</p> <p>Der er pt. ingen godkendte vækstreguleringsmidler.</p> <p>Hvis planterne står meget lyst eller meget koldt nedsættes behovet for retardering. Retarderingen forsinker blomstringen i 2-3 uger i forhold til ikke retarderede planter.</p>
Blomstring	<p>Begynder normalt i dec. og varer til april. Behandling med vækstreguleringsmidler forsinker blomstringen 2-3 uger.</p> <p>Blomsteranlæggene dannes om sommeren, høj lysintensitet er nødvendig. Planterne kan udmærket sættes på friland om sommeren, tages ind i september, og dyrkes videre ved 8-10°C. Blomstringen kan, ifølge tyske informationer, ikke styres, men 10 uger ved lav temperatur er nødvendig for at opnå en god blomstring.</p> <p>Planten kan derfor kun sælges fra december til slutningen af april.</p>

Kulturlængde	Alt efter formeringstidspunkt er kulturtiden 7-9 mdr.
Holdbarhed	J. pauciflora er meget følsom over for ætylen.
I øvrigt	Der er ingen oplysninger om sygdomme og skadedyr,
Litteratur	INFO 7093, 8229, 9850. Röber,R.,et.al. 1994: Jacobinien. I Topfpflanzenkulturen. Verlag E. Ulmer.