

**STANDARD DYRKNINGSVEJLEDNING**

**FOR**

**CHAMAECYPARIS LAWSONIANA**

**'ELLWOODII'**

	<b>Chamaecyparus lawsoniana 'Ellwoodii'</b>
<b>Botanik</b>	<p><b>Familie:</b> Cupressaceae</p> <p><b>Hjemsted:</b> Nordvestlige USA</p> <p><b>Dansk navn:</b> Ædelcypres (Chamaecyparis lawsoniana), også kaldt Lawsoncypres</p>
<b>Formering</b>	<p>Stiklingeformeres.</p> <p>Der anvendes "top"-stiklinger, så urteagtige som muligt, 5-8 cm lange.</p> <p>Stikkes i ugødet, ukalket sphagnum.</p> <p>Temperatur: 20-24°C</p>
<b>Potning</b>	<p>Hvis der er stukket i formeringsenheder pottes senere i 9-10 cm potte i ugødet, ukalket sphagnum.</p> <p>Ind til planterne sættes på friland holdes 20-22°C.</p>
<b>Gødning</b>	<p>Vandes med gødningsvand sammensat i forholdet:</p> <p style="text-align: center;">N : P : K : Ca : Mg 100 : 13 : 75 : 36 : 9 + mikronæring.</p> <p>Udvandes med Lv 1,1-1,4.</p> <p>Mindst 10% af kvælstoftilførslen skal være som ammoniumkvælstof.</p> <p>Planterne må ikke tørre ud, men heller ikke "soppe" i vand.</p> <p>Ledningsværdien må ikke blive for høj.</p> <p><b>pH</b> i voksemediet skal i hele dyrkningsperioden holdes på 4,8 – 5,2, hvis værdien bliver højere, får planterne brune nålespidser. Det er lettest at holde pH på det ønskede niveau med ammoniumholdige gødninger.</p>
<b>Planteskadegørere</b>	Pythium, phytophthora, fusarium, gråskimmel
<b>Produktion Produktionstid</b>	<p>Stikke om efteråret eller om foråret, hvor stiklingerne skæres på drevne moderplanter.</p> <p>Planterne roder i hus, og når der ikke er fare for nattefrost, sættes de på friland. Herefter er planten hårdfør.</p> <p>Produktionstiden er 1-2 år, efterårsstukne planter kan sælges det følgende efterår, men de er små.</p> <p>Det normale er en produktionstid på 1,5-2 år.</p>
<b>Litteratur</b>	Aendekerk, Th., 2000: Zuurgrad schuldig aan bruine punten Ellwoodii. De Boomkwekerij (9):18-19