

DYRKNINGSNOTE

FOR

MONOPSIS LUTEA

	Monopsis lutea
Botanik	Familie: Campanulaceae Hjemsted: Sydafrika
Anvendelse	Ampelplante eller frit udplantet.
Formering	Stiklingeformeres: Ledstiklinger roder let. Fra stængelbasis dannes mange, unge skud.
Potning Pladsforbrug	Til ampelplante anvendes 15-18 cm potte. Pottes fra oktober til december. Der pottes i en gødet sphagnum, pH 5,5-6,5.
Klima	Temperatur: 14-16°C til den vegetative fase. Blomsterinduktion ved +5°C (døgngennemsnit i 4 uger), derefter igen 14-16°C. I maj må gerne holdes 12°C om natten.
Vand, Gødning, CO₂	Planterne må aldrig tørre ud, men god afdræning er nødvendig. For højt pH i potteklumpen kan, især ved de lave temperaturer, forårsage jernmangelklorose. Lv. 1,4-1,6.
Vækstregulering	Planterne knibes 1-2 gange for et få en god forgrening.
Blomsterinduktion Blomsterudvikling	Blomsterne induceres ved kuldebehandling, 5°C i døgngennemsnit i 4 uger. Det fremmer blomsternes udvikling, hvis der efter kølebehandlingen gives lys, 20 W pr. m ² , så dagen bliver 16 timer.
Vækstlys	Uden vækstlys er der ingen blomster før juni.
Skadegørere	Rhizoctonia Botrytis (gråskimmel) Trips
Litteratur	Wicki-Friedl, P., 1993: Monopsis lutea - Goldene Lobelia für Beet und Balkon. Zierpflanzenbau (2): 70-72.