

**DYRKNINGSNOTE**

**FOR**

**ASCLEPIAS SP.**



*Foto: Floradania.dk*

|                   |                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <b>Asclepias physocarpa</b>                                                                                                              |
| <b>Botanik</b>    | <b>Familie:</b> Asclepidaceae<br><b>Hjemsted:</b> Sydlige Africa                                                                         |
| <b>Formering</b>  | <b>Frøformeres.</b><br>Ved 18-20°C spirer frøene på 2-3 uger.<br>Kan formeres ved stiklinger.                                            |
| <b>Klima</b>      | <b>Temperatur</b> 12-15°C<br>Dyrkes lyst.                                                                                                |
| <b>Vand</b>       | Planterne holdes forholdsvis tørt.                                                                                                       |
| <b>Blomstring</b> | Hvis planten får meget vand blomstrer den først om efteråret ved en højde på ca. 2 m.<br>Stiklingeformede planter blomstrer først 2. år. |
| <b>I øvrigt</b>   | Som småplante og i ungdomsstadiet vokser planten langsomt.                                                                               |
| <b>Litteratur</b> | Zechner, G. 1992: Asclepias physocarpa, die Seidenpflanze. DeGa (6):318                                                                  |

|                        |                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <b>Asclepias currasavica</b>                                                                                                                                     |
| <b>Botanik</b>         | <b>Familie:</b> Asclepidaceae<br><b>Hjemsted:</b> Curacao = Suriname<br>Dansk navn: Silkeplante                                                                  |
| <b>Formering</b>       | <b>Frøformerig.</b><br>Sås midt i januar i en letgødet sphagnumblanding ved 18° C. I slutningen af februar prikles i formeringsenheder, tre planter i hvert hul. |
| <b>Potning</b>         | I slutningen af april pottes i en 12 cm potte                                                                                                                    |
| <b>Klima</b>           | <b>Temperatur</b> 8-12°C.<br>Undgå høj luftfugtighed, så luft på.<br><b>Skygge:</b> Kun for at holde temperaturen nede.<br>Tåler let frost, -2-3°C.              |
| <b>Vækstregulering</b> | Kan knibes kort efter oppotning.                                                                                                                                 |
| <b>Blomstring</b>      | Blomstrer fra juni til oktober.                                                                                                                                  |
| <b>Skadevoldere</b>    | Kan angribes af snegle, mellus, bladlus, spindemider og cikader. Virusangreb ses også.                                                                           |
| <b>Litteratur</b>      | <b>Essig,W.</b> , 1984: Weniger bekannte Topf- und Beetpflanzen unter die Lupe genommen.                                                                         |

### **Asclepias tuberosa**

|                |                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Botanik</b> | <b>Familie:</b> Asclepidaceae<br><b>Hjemsted:</b> Østlige USA                                       |
| <b>Gødning</b> | Gødningssammensætning i forholdet:<br>N : P : K : Ca : Mg<br>100 : 24 : 144 : 37 : 20 + mikronæring |