

STANDARD DYRKNINGSVEJLEDNING

FOR

ASTERISCUS MARITIMUS



Foto: Floradania.dk

Botanik	Familie: Compositae Hjemsted: Vestlige middelhavsområde, Portugal, Grækenland, Kanariske øer.
Formering	Stiklingeformeres. 5-8 cm lange topstiklinger. Ved 18°C varer rodningen 3-4 uger.
Potning Pladsforbrug	Der pottes i 9-11 cm potter. Voksemediet er en letgødet, mellemfin spagnumblanding pH 5,5-6,0. Den første tid står planterne pottetæt, slutafstand er 20-25 planter pr. m². Planterne må ikke stå for tæt, det giver gule blade i bunden og bladfald.
Klimaforhold	Temperatur: Stikkes ved 18°C, efter oppotning 18°C - 20°C, 10 dage senere sænkes temperaturen til 12°C - 14°C. Luft ved 16°C. Se i øvrigt blomsterinduktion. Skygge: Planten er meget lyskrævende, så der skygges ikke.
Vand, Gødsning CO₂	Planterne er ret næringskrævende, men ingen specifikke oplysninger. Lv 1,5-2,0.
Vækstregulering	Knibning: I den vegetative fase forgrener planten sig ikke, hvorfor det er nødvendigt at knibe planten. Herefter udvikles rigeligt antal sideskud. Der knibes over 5-6 blade, ca. 1 uge efter potning. Dette giver 5-6 ensartede brydninger. Ønskes flere brydninger knibes en ekstra gang, men ikke senere end 8 uger før salg. Efter blomsterinduktion forgrener planterne sig godt Morgendrop og neg. DIF. Når sideskuddene er ca. 3 cm lange begyndes med morgendrop eller negativ DIF. Morgendrop betyder, at kort før solopgang sænkes temperaturen til 5°C og der luftes ved 8°C. Kl. 11 hæves temperaturen til 12°C og der luftes ved 16°C, kl. 16 er temperaturen 16°C og der luftes ved 18°C. Denne temperatur holdes til næste morgen

Blomsterinduktion og -udvikling	Blomsterdannelse- og udvikling er afhængig af lystilførslen. Der kræves høj lysintensitet og ikke for kort dag, for at danne og udvikle blomster, men om det er daglængden eller lyssummen (indstråling x timer) der er afgørende vides ikke. Lav temperatur inducerer også blomster. Hvis der ønskes blomster i april, må der pottes ca 1. december. Ca. 1 uge senere knibes over 5-6 blade og når skuddene er 3-4 cm lange, sænkes temperaturen fra 18°C til 6-8°C. i 4-5 uger. Herefter må temperaturen ikke komme over 16°C. Til blomstring midt i maj kan pottes i begyndelsen af februar og i så fald sænkes temperaturen kun til 14°C.
Lys	Vækstlys, 30-40 W pr. m ² SON-T lamper giver lavere planter og 4-5 dages tidligere blomstring end ingen vækstlys.
Plantebeskyttelse	Saintpauliatrips, Mellus, Bladlus Ved bladlusangreb åbner blomsten sig ikke.
Kulturtid	Ved stikning i okt.-nov. er kulturtiden 5-6 mdr., i vinterperioden kan holdes 6-8°C, og planterne blomstrer ca. 2 uger før de, som er stukket i januar - februar, hvor kulturtiden er 3-4 mdr.
I øvrigt	A. maritimus har altid åbne blomster, let overhængende vækst og er vejrbestandig. Løvet virker sølvfarvet.
Litteratur	Christensson, Hans 1988: Asteriscus - en ny lovande utplanteringsväxt. Fakta, Trädgård nr. 622, Kp. 1987: i "Zierpflanzenbau" nr. 15 . Veitschöchheimer Arbeitsgruppe, 1996:Asteriscus maritimus 'Gold Coin'. DeGa (25):1438