

DYRKNINGSNOTE

FOR

CODONANTHE CRASSIFOLIA



Foto: Floradania.dk

	Codonanthe crassifolia
Botanik	Familie: Gesneriaceae Hjemsted: Nordlige Sydamerika
Formering	Stiklingeformerer. Der anvendes ledstiklinger, og der stikkes 2-3 stk. i en 10-11 cm potte. Rodningstemperaturen er 20-22°C, senere sænkes til 18-20° C.
Vand Gødning CO₂	Der er ingen oplysninger om gødningssammensætningen, men da den tilhører Gesneriaceae skal der sandsynligvis gives mere kalium end kvælstof. Planterne må aldrig tørre ud, men tåler heller ikke stående vand.
Blomstring	Hvorledes planten induceres til blomst vides ikke, men noget tyder på, at der er en sammenhæng mellem lysstyrken og belysningstiden
Fysiogene problemer	Vandmættet jord og/eller stærke temperatursvingninger kan føre til bladfald. Planten tåler ikke koldt vand på bladene, mere end 6°C forskel.
Kulturtid	6-9 mdr. fra stikning
Litteratur	Christensson,H., 1988: Elva Gloxiniasläktingar. Trädgård 343. Alnarp.
I øvrigt	Efter blomstringen dannes ofte små gule frugter.