

STANDARD DYRKNINGSVEJLEDNING

FOR

NICOTIANA X SANDERAE



Foto: floradania.dk

	NICOTIANA X SANDERAE
Botanik	Familie: Solanaceae Hjemsted: Sydamerika Krydsning mellem N. alata og N. forgetiana.
Sorter	'Havanna F ₁ ', fås i hvid og forskellige røde (rosa) nuancer. Blomstrer når den er 12-15 cm. høj. 'VIP'F ₁ , - hybrider fås i gul, rød, hvid og bliver 45 cm høj. 'Starship'F ₁ , hybrider fås i røde og gule nuancer samt hvid, bliver 30 cm høj. Kontakt småplanteleverandørerne for information om andre sorter
Formering	Frøformeres. Der anvendes 1/2 g frø = 1.500 korn til 1.000 planter. Sås fra januar til marts. Ved 20-22°C spirer frøene på 8-10 dage. Der sås tyndt eller i pløksystemer, såjorden er en svagtgødet sphagnumblanding, pH ca. 6. Lysspirende, så der dækkes kun ganske let med spagnum eller vermiculite, eller kun med plast for at hindre udtørring.
Potning Pladsforbrug	4-5 uger efter såning priklepottes, 1 plante pr. potte, i 8-10 cm. potte. Der pottes i en gødet sphagnumblanding, pH ca. 6. Pottetæt 100-140 planter pr. m ² . Afstand: 70-80 planter pr. m ² .
Klimaforhold	Temperatur: Spiring: 20-22°C. Videre vækst: 16°C. Evt. morgendrop til 12°C, se vækstregulering.
Vand Gødning CO₂	Nicotiana har et højt næringsstofforbrug, gødningssammensætningen kendes ikke, men mere kalium end kvælstof.
Vækstregulering	De fleste nye sorter bliver kun 30-40 cm. høje. Morgendrop til 12°C et par timer i forbindelse med solopgang virker hæmmende på strækningsvæksten. Der kan være behov for vækstregulering.
Plantebeskyttelse	Bladlus Snegle
Kulturtid	Fra såtidspunktet til salg: 8-9 uger.