

**DYRKNINGSNOTE**

**FOR**

**MURRAYA PANICULATA**



*Foto: floradania.dk*

	<b>Murraya paniculata</b>
<b>Botanik</b>	<b>Familie:</b> Rutacea <b>Hjemsted:</b> Sydøstasien og Indien.
<b>Formering</b>	<b>Stiklingeformerig.</b> Skæring af stiklinger kræver en speciel teknik, som tilsyneladende er for specialister, og ikke bliver forklaret. Der anvendes halvmodne stiklinger. <b>Frøformerig.</b> Der sås helst i februar, da man på det tidspunkt kan få frisk frø. Næste frøhøst er i juni/juli, men tidspunktet kan forsinkes. Frøene leveres med frugtkødet på, så frøene kan holde sig friske. Frøene renses i vand, for at fjerne frugtkødet. På et modent bær er frugtkødet blødt, og der er i reglen 2 frø i hvert bær. Der sås ca. 500 frø i en 30 x 50 cm såkasse, og frøene dækkes let. Efter 4 uger ved 22°C i jorden kan kun bladene ses. Efter yderligere 2 mdr. kan planterne prikles i netpotter eller andre formeringsenheder.
<b>Videre kultur</b>	Temperatur 20-22°C, meget lyskrævende.
<b>I øvrigt</b>	Frøformerede planter er adskillige år om at blomstre, men da planten er meget graciøs i opbygning, kan den udmærket sælges som grøn plante. Blomstrer naturligt om foråret.
<b>Potning Pladsforbrug</b>	Der pottes 3-4 planter i 9, 10 eller 11 cm potte.
<b>Litteratur</b>	Rotter,W., 1990:Sortimentsbereicherung in Hydrokultur durch neue und wiederentdeckte Pflanzen. Zierpflanzenbau 30(15):506-600