

DYRKINGSNOTE

FOR

ARAUCARIA COLUMNARIS

ARAUCARIA HETEROPHYLLA

	Araucaria columnaris (syn A. excelsa) Araucaria heterophylla
Botanik	Familie: Araucariaceae Hjemsted: Ny Caledonien, Norfolk Island.
Formering	Frøformerig: Det er lettest at formere via frø, men problemet er dels, at det kun er hvert 4-5 år, der rigtig produceres mange frø, (de høstes i naturen), dels, at planterne ofte er ret forskellige. Frøene skal sås helt friske, helst ikke mere end 10-14 dage efter høst, for at give en tilfredsstillende spiringsprocent. Voksemediet, som er en letgødet sphagnumblanding med pH på ca. 6, lægges ud i et 6-10 cm tykt lag på bed. Frøene lægges med undersiden mod voksemediet i rækker så tæt som muligt og så hurtigt som muligt, da spiringen allerede er i gang. Kan alle frøene ikke lægges ud første dag, lægges resten i en tyndt lag på plastik med undervarme, og de vandes lidt. Spiren løfter frøkapslen op fra voksemediet, og kapslen skydes senere af. Frøet vejer 0,75 - 1,0 g, og måler ca. 2,5 x 1,5 cm. Der sås 2.000 frø til 1.000 planter, og der sås 800 – 1.200 frø pr. m². Ved 28 - 30°C i voksemediet og 26 - 28°C i luften varer spiringen ca. 10 dage. Spiringen foregår i plasttelt, som åbnes/fjernes efter ca. 3 uger. Voksemediet holdes fugtigt, og efter 6-8 uger begynder man at vande med en svag gødningsopløsning. Stiklingeformerig. Araucaria kan også stiklingeformeres, der anvendes topstiklinger.