

DYRKNINGSNOTE

FOR

EURYOPS TENUISSIMUS

	Euryops tenuissimus
Botanik	Familie: Compositae Hjemsted: Kapprovinsen
Sorter	Den mest udbredte sort er 'Sonnenschein'.
Formering	<u>Stiklingeformeres.</u> Der stikkes direkte i 10 cm potte eller i pløksystemer, pH 5,5-6,0. 1-3 stiklinger pr. potte. Ved at stikke 3 stiklinger fås, under langdagsforhold hurtigst en salgsfærdig plante. Stikkes kun 1 stikling skal denne knibes, hvilket forlænger kulturtiden med ca. 3 uger, men under kort dag giver det en lige så god vare, og man sparer udgifter til 2 stiklinger. Ved 18-20°C roder stiklingerne på 3-4 uger.
Potning Pladsforbrug	Slutafstand 35-40 pr. m ² .
Klima	<u>Temperatur:</u> Feb.-marts: 14°C, luft ved 16°C. April: 16°C, luft ved 18°C. Ikke for høj relativ luftfugtighed
Vand, gødning	Sandsynligvis lidt mere kvælstof end kalium.
Vækstregulering	<u>Knibning:</u> Planten bryder med flest sideskud, hvis der knibes under kortdagsforhold. I lang dag bryder planten ofte kun med 1-2 skud. Knibning forlænger kulturtiden med 3 uger. Vokser mest kompakt ved kort dag.
Blomstring	Der dannes flest blomster i kort dag, daglængden skal være under 12 timer. Hvis planten knibes under langdagsforhold, vil der dannes mange sideskud uden blomster og disse sideskud vokser hurtigere end de inducerede sideskud, så planten bliver skæv.
Moderplanter	Størst stiklingeproduktion ved lang dag. Under kortdagsforhold er der knopper i for mange stiklinger.
I øvrigt	I hjørnerne, hvor bladstilkens fæstes til stænglen, dannes små, hvide "uldtotter", som kan minde om uldlus.

Litteratur

Eichin, R. & E. Deiser, 1986: *Euryops tenuissimus* - Eine neue Topf-pflanze? *Zierpfl.b.* (26):1007-8.

Escher, F: et al. 1990: *Euryops tenuissimus* - eine bereicherung im Sortiment. *Deutsch. Gt.bau* (31): 1980-83.