

STANDARD DYRKNINGSVEJLEDNING

FOR

ASTERISCUS MARITIMUS



Foto: Floradania.dk

Botanik	<p>Familie: Compositae</p> <p>Hjemsted: Vestlige middelhavsområde, Portugal, Grækenland, Kanariske øer.</p>
Formering	<p>Stiklingeformeres.</p> <p>5-8 cm lange topstiklinger. Ved 18°C varer rodningen 3-4 uger.</p>
Potning Pladsforbrug	<p>Der pottes i 9-11 cm potter. Voksemediet er en letgødet, mellemfin spagnumblanding pH 5,5-6,0.</p> <p>Den første tid står planterne pottetæt, slutafstand er 20-25 planter pr. m².</p> <p>Planterne må ikke stå for tæt, det giver gule blade i bunden og bladfald.</p>
Klimaforhold	<p>Temperatur:</p> <p>Stikkes ved 18°C, efter oppotning 18°C - 20°C, 10 dage senere sænkes temperaturen til 12°C - 14°C.</p> <p>Luft ved 16°C.</p> <p>Se i øvrigt blomsterinduktion.</p> <p>Skygge:</p> <p>Planten er meget lyskrævende, så der skygges ikke.</p>
Vand, Gødskning CO₂	<p>Planterne er ret næringskrævende, men ingen specifikke oplysninger. Lv 1,5-2,0.</p>
Vækstregulering	<p>Knibning: I den vegetative fase forgrener planten sig ikke, hvorfor det er nødvendigt at knibe planten. Herefter udvikles rigeligt antal sideskud. Der knibes over 5-6 blade, ca. 1 uge efter potning. Dette giver 5-6 ensartede brydninger. Ønskes flere brydninger knibes en ekstra gang, men ikke senere end 8 uger før salg. Efter blomsterinduktion forgrener planterne sig godt</p> <p>Morgendrop og neg. DIF.</p> <p>Når sideskuddene er ca. 3 cm lange begyndes med morgendrop eller negativ DIF. Morgendrop betyder, at kort før solopgang sænkes temperaturen til 5°C og der luftes ved 8°C. Kl. 11 hæves temperaturen til 12°C og der luftes ved 16°C, kl. 16 er temperaturen 16°C og der luftes ved 18°C. Denne temperatur holdes til næste morgen</p>

Blomsterinduktion og -udvikling	<p>Blomsterdannelse- og udvikling er afhængig af lystilførslen. Der kræves høj lysintensitet og ikke for kort dag, for at danne og udvikle blomster, men om det er daglængden eller lyssummen (indstråling x timer) der er afgørende vides ikke. Lav temperatur inducerer også blomster.</p> <p>Hvis der ønskes blomster i april, må der pottes ca 1. december.</p> <p>Ca. 1 uge senere knibes over 5-6 blade og når skuddene er 3-4 cm lange, sænkes temperaturen fra 18°C til 6-8°C. i 4-5 uger.</p> <p>Herefter må temperaturen ikke komme over 16°C. Til blomstring midt i maj kan pottes i begyndelsen af februar og i så fald sænkes temperaturen kun til 14°C.</p>
Lys	<p>Vækstlys, 30-40 W pr. m² SON-T lamper giver lavere planter og 4-5 dages tidligere blomstring end ingen vækstlys.</p>
Plantebeskyttelse	<p>Saintpauliatrips, Mellus, Bladlus</p> <p>Ved bladlusangreb åbner blomsten sig ikke.</p>
Kulturtid	<p>Ved stikning i okt.-nov. er kulturtiden 5-6 mdr., i vinterperioden kan holdes 6-8°C, og planterne blomstrer ca. 2 uger før de, som er stukket i januar - februar, hvor kulturtiden er 3-4 mdr.</p>
I øvrigt	<p>A. maritimus har altid åbne blomster, let overhængende vækst og er vejrbestandig.</p> <p>Løvet virker sølvfarvet.</p>
Litteratur	<p>Christensson, Hans 1988: Asteriscus - en ny lovande utplanteringsväxt. Fakta, Trädgård nr. 622,</p> <p>Kp. 1987: i "Zierpflanzenbau" nr. 15 .</p> <p>Veitschöchheimer Arbeitsgruppe, 1996:Asteriscus maritimus 'Gold Coin'. DeGa (25):1438</p>