

DYRKNINGSNOTE

FOR

ACALYPHA SP.



Foto: Floradania.dk

Copyright HortiAdvice 2023

	Achalypha sp.
Botanik	Familie: Euphorbiaceae. Hjemsted: Ny Guinea - forvildet til hele tropeområdet.
Formering	<u>Stiklingeformering:</u> I reglen tages topstiklinger fra januar til juli. Stikkes i formeringsenheder, småpotter eller pløkbrætter. Rodning på ca. 14 dage ved 20-22° C i luften, 22°C jordtemperatur.
Potning Pladsforbrug	Ca. 14 dage efter rodning pottes 1-2 stiklinger i 11-12 cm potte. Slutafstand 20 - 25 planter pr. m ²
Klimaforhold	Temperatur: Sommerhalvåret 20-25°C dag, nat 18°C. Om vinteren 18-20°C, kan overleve ved 12°C. Skygge: Kun let skygge i forbindelse med potning og ved meget kraftig indstråling om sommeren, over 450 W pr. m ² . God blomsterfarve fås ved 16-18°C.
Vand Gødskning CO₂	Vanding: Ved hver vanding tilføres gødning i forholdet: N : P : K : Ca : Mg 100 : 17 : 115 : 85 : 20 + mikronæring Lv i udvandingsvandet på 1,6-1,9.
Blomstring	Blomsterinduktion og -udvikling er tilsyneladende afhængig af lyssummen, ikke daglængden.
Vækstregulering	Knibning: Planterne kan knibes blødt et par uger efter potning. Knibes planterne, er retardering ikke altid nødvendig, og i hvert fald i lavere dosering.
Skadegørere	Rhizoctonia, spindemider, mellus, bladlus
Moderplanter	Moderplanter udvælges blandt de bedste salgsplanter. Overvintrer ved 12 - 15°C 4 - 6 uger før første skæring af stiklinger stilles planterne lyst og varmere.

Kulturtid

10 cm potte: 2 - 3 mdr.

11 - 12 cm potte: 5 - 6 mdr.