

**DYRKNINGSNOTE**

**FOR**

**NERIUM OLEANDER**



*Foto: floradania.dk*

	<b>Nerium oleander</b>
<b>Botanik</b>	<b>Familie:</b> Apocynaceae <b>Hjemsted:</b> Middelhavsområdet, Sydportugal til Østasien
<b>Formering</b>	<b>Stiklingeformerer.</b> Både urteagtige og træagtige stiklinger kan anvendes. Jordtemperatur 20-25°C. Stikkes i formeringsenheder med 1 (2) stikling i hver.
<b>Potning Pladsforbrug</b>	Der pottes i en gødet, kalket sphagnum, en plante pr. potte. Der pottes i 11-13 cm potte. Der kan senere pottes op i større potter. Slutafstand i 12 cm potte er 12-18 pr. m <sup>2</sup> .
<b>Klimaforhold</b>	<b>Temperatur:</b> Om natten holdes 15-18°C, højere temperatur medfører kraftig strækningsvækst og en forsinkelse af blomstringen. Dyrkes lyst, køligt om vinteren, 14-16°C. <b>Luftfugtighed:</b> For lav luftfugtighed medfører ofte et spindemideangreb. <b>Skygge:</b> Der skygges kun for at holde temperaturen nede. Nerium danner bedst blomst ved høj indstråling.
<b>Vand Gødning CO<sub>2</sub></b>	Vandes med blandingsgødning sammensat i forholdet: N : P : K : Ca : Mg 100 : 11 : 89 : 67 : 11 + mikronæring CO <sub>2</sub> -koncentrationen 600-800 ppm fremmer væksten.
<b>Vækstregulering</b>	<b>Knibning.</b> 3-5 uger efter rodning knibes over 2 (-3) bladpar. <b>Retarding.</b> Der kan være behov for vækstregulering.
<b>Blomsterdannelse</b>	Blomsterne dannes hurtigst ved 14-16°C og høj lysintensitet.
<b>Skadegørere</b>	Uldlus, Skjoldlus, Bladlus Bakterier
<b>Fysiogene skader</b>	Nekrotiske pletter kan opstå, hvis planten er dyrket i skygge, og så pludselig får fuld sol.