

STANDARD DYRKNINGSVEJLEDNING

FOR

ASTER ERICOIDES



Foto: Floradania.dk

	Aster ericoides
Botanik	Familie: Compositae Hjemsted: Nord- og Mellemamerika. Vækstform: På dens naturlige voksested kan planten blive over 1 m høj tæt busk, med stærkt forgrenede stængler, der kun er svagt behårede. Bladene er helrandede, smalt lancetformede, uden stengel. Blomsterstanden er klaseformet. Blomsterhovederne er små og talrige. Randblomsterne er meget smalle, hvide eller svagt rosa, sjældent blå. Skiveblomsterne er gullige til mørkebrune.
Formering	Stiklingeformeres. Der anvendes 4-5 cm lange topstiklinger. Ledstiklinger kan bruges, men er ikke så anvendelige. Der stikkes i formeringsenheder eller direkte i salgspotten. Stikkemediet skal være svagtgødet, pH 5,5-6,5. Temperatur 20-22°C og der dækkes med plast.
Potning, pladsforbrug	Der stikkes/pottes 3 stiklinger i en 11-12 cm potte eller 1 stikling i en 9 cm potte.
Klima	Temperatur: Efter potning eller god roddannelse holdes 14-16°C, til blomsterinduktion gerne 12°C.
Vand, gødning	Gødningssammensætning sandsynligvis som til Aster novi-belgii. Planterne må ikke tørre for kraftigt ud. Lv i vandingsvandet ca. 1.8.
Vækstregulering	Knibning. Knibes på stikkebedet og eventuelt en gang mere.
Blomsterinduktion	A.ericoides er en kortdagsplante, med en kritisk daglængde på 10-14 timer. Derfor er det i sommerperioden nødvendigt at give planterne kort dag, 10 timer i 4-5 uger. Vær opmærksom på, at temperaturen under gardinerne kan blive meget høj. Når temperaturen kommer i nærheden af 30°C er virkningen af kort dag meget ringe.
Vækstlys, dagforlængelse	I vinterperioden er det nødvendigt at holde lang dag ind til ca. en uge efter oppotning, ellers bliver planterne for små. Dagforlængelse kan gives som natafbrydelse eller fra kl. 22 til morgen. Der kan anvendes glødelamper, men det bedste er SON-T lamper, 30 W pr m ² .

Moderplanter	Udvalgte moderplanter kan overvintre ved 2-4°C, drives ved 15°C og lang dag, dvs. 16-18 timer dag eller 6-7 timer natafbrydelse.
Skadevoldere	Meldug, spindemider
Litteratur	Ann. 1987: Aster ericoides, Compositae. Gb+Gw-Pflanzenarchiv. Paul Parey.