

DYRKNINGSNOTE

FOR

CLIVIA MINIATA

	Clivia miniata
Botanik	Familie: Amaryllidaceae Hjemsted: Natal-provinsen
Formering	Frøformerig: Frugten er et kugleformet bær, som maksimalt indeholder 6 frø, i reglen er kun de 4 spiredygtige. Fra blomstring til fuldt modent bær går i reglen 9-10 måneder. Da frøets spireevne meget hurtigt forringes, sås så hurtigt som muligt efter modning. ved 20-22°C spirer frøet på 3-6 uger. Kan også vævsformeres .
Potning	Når det første løvblad viser sig, pottes planten i en 8 cm potte.
Klima	Temperatur: 18-22°C, bortset fra køleperioden, hvor der holdes 8-10°C. Efter køleperioden hæves temperaturen til ca. 20°C, så snart man kan se knopperne. Skygge: Om sommeren skygges let.
Vand, gødning, CO₂	Der vandes om foråret 1-1,5 promille N-betonet gødningsvand, fra juli, når blomsterinduktionen begynder, gives mere kalium end kvælstof, og koncentrationen hæves til 2-2,5 promille. Efter hvileperioden fra oktober til december vandes en gang om ugen med 2 promille.

Blomstring	<p>Blomsterinduktionen sker om sommeren. Når induktionen er helt færdig, dvs. alle blomsteranlæg er dannet, skal planten køles.</p> <p>Køling vil her sige, at planten skal have mindst 1000 timer under 10°C, for ellers strækker blomsterstænglen sig ikke.</p> <p>Efter kuldebehandlingen hæves temperaturen for at få blomsterstanden til at udvikle sig.</p> <p>Udviklingen sker hurtigst ved 20°C, fra synlig blomsterstand til udsprungne blomster går ca. 12 dage, ved 15°C ca. 19 dage og ved 10°C ca. 53 dage.</p>
Planteskadedørere	Uldlus
Produktionstid	Fra såning til salg (dec.-jan.) går minimum 2 1/4 år, ofte blomstrer planten først femte år.
Litteratur	<p>Zimmer,K., 1975: Zur Kultur und zum Blühen von Clivia miniata. DeGa 29(31):1191-1192</p> <p>Röber et al, 1994: Clivia. I Topfpflanzenkulturen. Ulmer.</p>