

**DYRKNINGSNOTE**

**FOR**

**COREOPSIS SP.**

	<b>Coreopsis sp.</b>
<b>Botanik</b>	<b>Familie:</b> Asteraceae <b>Hjemsted:</b> Nord- og Sydamerika
<b>Arter</b>	C. tinctoria, gule, brune, rødlige farvtoner C. maritima, lysende gul C. stillmannii, gul C. drummondii, gul med mørk midte C. grandiflora, der findes en del sorter C. lanceolata, der findes en del sorter
<b>Formering</b>	Frøformerings: C. grandiflora 'Early Sunrise' kan sås fra januar til juni. C. grandiflora sås enten i pløksystemer eller direkte i salgspotten, 3-5 korn pr. potte. 5 g frø giver 1000 planter. Spiring på 2-3 uger ved 15°C. Ved 22°C spirer frøene på 1 uge. Frøene må ikke dækkes med voksemedium. Stiklingeformerings: Til stiklingeformerings egner 'Early Sunrise', 'Cutting Gold', 'Sunray', 'Sonnenkind' og 'Mayfield Riesen' sig.
<b>Potning Pladsforbrug</b>	C. grandiflora 'Early Sunrise' pottes i 10 cm potte. 48 planter pr. m <sup>2</sup> .
<b>Klima</b>	Temperatur: 16-18°C, luft ved 24°C. Skygge: Der skygges kun ved meget kraftig indstråling.
<b>Vand, gødning</b>	Vandes med gødningssammensætning med lige meget kalium og kvælstof. Planterne tåler ikke overvanding, men de er næringskrævende.
<b>Blomstring</b>	Coreopsis lanceolata dyrkes ved kort dag (11 timer dag) ind til der er 16 blade i rosetten, herefter gives lang dag (over 13 timer eller natafbrydelse) i 6-8 dage. Derefter igen kort dag. Planterne bliver, ved kun at give dem 6-8 lange dage, ca. 10 cm kortere, end planter som står ved lang dag ind til blomstring.
<b>Planteskadegørere</b>	Meldug, bladlus
<b>Produktionstid</b>	Coreopsis lanceolata: Fra såning til salg 16 uger, fra oppotning til salg 9 uger. Coreopsis grandiflora: Blomstring første år: 6-7 mdr. Blomstring andet år: 9-11 mdr.