

**DYRKNINGSNOTE**  
**FOR**  
**CALLISTEPHUS CHINENSIS**



*Foto: Floradania.dk*

	<b>Callistephus chinensis</b>
<b>Botanik</b>	<b>Familie:</b> Compositae <b>Hjemsted:</b> Mellem-, Nord- og Østasien
<b>Sorter</b>	Der kommer stadig nye sorter, så derfor henvises til frøkatalogerne.
<b>Formering</b>	Frøformeres. 1 g = 500 frø. Der anvendes 5 g frø til 1.000 planter. Formeres ved 15-16°C, spiringen varer 7-14 dage. Småplanterne kan prikles /priklepottes efter ca. 8 uger.
<b>Potning</b>	Pottes i 11 cm pottes.
<b>Klima</b>	Temperatur: 15 - 17°C, luft ved 20-21°C
<b>Vand, gødning, CO<sub>2</sub></b>	Der gødes med en blandingsgødning, hvor kali-indholdet er højere end kvælstofindholdet.
<b>Blomstring</b>	Lang dag fremmer blomsterdannelsen. Daglængden er ikke kendt præcis, men ligger mellem 12 og 14 timer. Blomsternes udvikling fremmes af kort dag, som også hæmmer stængelstrækning. Knopdannelsen sker hurtigere ved god indstråling end ved lav. Efter potning om vinteren gives vækstlys 20-30 W/m <sup>2</sup> i 7-8 uger. Når knopperne er dannet, gives kort dag, 10 timer. Ved sommerproduktion er 4-5 uger kort dag tilstrækkeligt.
<b>Kulturtid</b>	Hvis der sås i december-januar er planterne salgsfærdige ca. 1. maj. Sås medio april er kulturtiden 14-18 uger, meget afhængigt af sorten. Ved såning medio juni blomstrer planterne fra slutningen af august.
<b>Planteskadegørere</b>	Kan angribes af: Fusarium, verticillium, meldug, nematoder (bladål), cikader, viklerlarver, snegle, bladtæger. Callistephus er modtagelig for adskillige former for visnesyge. Der findes forskellige grader af resistens, men immunitet findes ikke.
<b>Litteratur</b>	Graaf-Van der Zande, M. Th. de & Bakker, J. A., 1993: Callistephus door licht sturen. Vakbl. Bloemist (21): 43

---

	Sprau,G., 1993: Callistephus als Topfkultur. GbGw 93(43):2046-2047 Würth,C., 1996: Lückenfüller aus Samen gezogen. Taspo Gartenbaumagazin 130(5):35-36,38-41
--	---

---