

DYRKNINGSNOTE

FOR

CALLUNA VULGARIS



Foto: Floradania

	CALLUNA VULGARIS
Botanik	Familie: Ericaceae. Hjemsted: Nordlige halvkugle fra Sibirien til NØ Amerika
Sorter	Der findes et stort antal sorter i farver fra hvid over lysviolet og lyserød til karminrød, og blomstringen finder sted fra juli til december, afhængigt af sort og knibningstidspunkt.
Formering	Stiklingeformerer: Topstiklinger (fjer-stikling, en enkelt gren) stikkes fra juni til august, ledstiklinger stikkes i august. Der stikkes i en grov sphagnum kalket til pH 4,5, i 5-6 cm potte, pløksystem eller kasser. Temperatur mindst 12°C, jordtemperatur mindst 2°C højere end luften. Stikning kan ske på friland eller i hus. Ved jordtemperatur på 14-16°C roder stiklingerne på 3-4 uger. Stiklingerne dækkes med plast.
Potning Pladsforbrug	Ofte købes der småplanter hjem. Der pottes i 10-11 cm potte, i en grov, svagt gødet sphagnum, pH 4,5 (0,5-1,0 kg kalk pr. m ³). I reglen pottes i marts - april, hvis der ikke er stukket i salgspotten, men man kan vente med potning til i maj. Slutafstand: 50-60 planter pr. m ² .
Klimaforhold	De rodede stiklinger kan overvintre på friland eller i hus. Vælges sidstnævnte løsning må temperaturen ikke blive for høj, luft på det meste af tiden, også for at holde luftfugtigheden nede. Hvis indstrålingen er høj på stikketidspunktet, kan det være nødvendigt at skygge eller dække med f.eks. Agryl (på friland). Efter knibning og oppotning sættes planterne på friland i maj - juni. Ved sen nattefrost må dækkes eller overbruses.
Vand Gødskning CO₂	Calluna bør ikke tørre helt ud, men tåler på den anden side heller ikke for vådt voksemedium. Det er nødvendigt med god afdræning. Der vandes med gødningsopløsning, sammensat i forholdet: N : P : K : Ca : Mg 100 : 10 : 60 : 30 : 10 + mikronæring. Lv. 1,4-1,7.

	<p>Står planterne på friland kan det efter en regnvejrperiode blive nødvendigt med et noget højere ledetal. Man kan også vælge at blande langtidsvirkende gødning i pottejorden, 2-3 kg pr. m² (3-6 mdr. virkning), og så vande med Lv ca. 1,2-1,4, (vær da opmærksom på perioder med høje temperaturer).</p>
Vækstregulering	<p>Planterne knibes ad flere omgange for at opnå en harmonisk vækst, første gang i april og sidste gang ultimo maj/primo juni. Det kan dog blive nødvendigt at knibe en enkelt kvist efter at planterne er sat på friland. Knibes senere end primo juni påvirker det både plantens størrelse og antallet af blomster.</p>
Blomstring	<p>Der findes ingen oplysninger om blomsterinduktion, men knibes der senere end 10. juli dannes ingen blomster, heller ikke på de sene sorter.</p>
Planteskadegørere	<p>Pythium, Phytophthora, Glomerella (colletotrichum), gråskimmel (Botrytis)</p>
Kulturtid	<p>12-18 måneder.</p>
Litteratur	<p>Härig, R., 1986: Einfluss des Stutztermin auf Entwicklung und Blühtermin von Erica cinerea und Calluna vulgaris. Zierpflanzenbau 26 (19) p. 729-730. Vegh, I., 1989: Maladies fongiques des bruyères en France. P.H.M. – Revue Horticole (300) p. 63-66. With, H.-H. 1989: Diverse artikler i Taspo Magasin (7).</p>