

STANDARD DYRKNINGSVEJLEDNING

FOR

ASPARAGUS DENSIFLORUS



Foto: Floradania.dk

	ASPARAGUS DENSIFLORUS
Botanik	Familie: Liliaceae. Hjemsted: Natalprovinsen, Sydafrika.
Formering	Frøformeres. 20-25 korn pr. gram, 1.200 korn til 1.000 planter. Normalt er spireprocenten på 50-60. Bør sås straks ved levering. Frøene lægges i blød 1 døgn, døde frø kan her skummes fra, da de flyder oven på. Kan sås i styroporkasser 30x60 cm, ca. 50 g. pr. kasse (= ca 80 potter med 7-8 planter i hver), eller der kan sås direkte i salgspotten. Der sås i letgødet sphagnumblanding, pH 5,5-6,0. Frøene kan dækkes med grus eller andet materiale for at ligge stabilt under spiringen. Da de er <u>mørkespirende</u> dækkes til slut med lystæt plast. Ved 20-24°C spirer planterne på 2-3 uger. Bedste såtidspunkt er okt.-jan., men der kan sås hele året.
Potning Pladsforbrug	Pottes efter 8 uger i 11 cm potter i letgødet sphagnumblanding, pH 5,5-6,0. Slutafstand: 35 planter pr. m².
Klimaforhold	Temperatur: Fra nov. - febr. 16°C. Resten af året 20°C, luft ved 24°C. Luftfugtighed: Ikke for høj relativ luftfugtighed, god luftbevægelse hæmmer gråskimmelangreb. Skygge: Kun skygge ved meget kraftig indstråling, især forår og forsommer, samt til nypottede planter.
Vand Gødsning CO₂	Om vinteren vandes med Lv 1,4-1,6 i gødningsopløsningen. Om sommeren med 1,6-1,9. Gødningssammensætning i forholdet: N : P : K : Ca : Mg 100 : 16 : 130 : 70 : 12 + mikronæring CO₂-tilførsel på 600-900 ppm.

Lys	Vækstlys, 20-30 W SON-T pr. m ² fremmer udviklingen betydeligt i vintertiden.
Produktionstid	Fra potning til salg (11 cm potte, 25-30 cm høj incl. potte) går der i den hurtigste dyrkningsperiode (april - juni) 8 uger, på den mørkeste årstid er produktionstiden mere end dobbelt så lang.
Skadevoldere	Fusarium, gråskimmel, trips, skudspidsmider, spindemider, bladlus, uldlus og skjoldlus
Litteratur	v. Hentig, W.-U. , 1988: Asparagus densiflorus u.a. Arten. Kulturkartei, Paul Parey, Berlin und Hamburg.